



Charakteristika odrůdy	
Žatecký poloraný červeňák (jemně aromatická odrůda)	
Původ	klonová selekce v původních porostech v žatecké a úštěcké oblasti, je pěstován v devíti klonech
Aroma	pravé, jemné chmelové
Vegetační doba	122 – 128 dní
Výnos	1,0 -1,5 t/ha
Rostlina	středně mohutný vzrůst válcovitého tvaru, réva zelenočervená, husté nasazení hlávek
Výskyt chorob	středně odolný až tolerantní k padlí chmelovému, středně odolný k peronospoře chmelové
Hlávka	středně až dlouze vejčitá, vřetenko jemné
Chmelové pryskyřice	
	celkové pryskyřice 13 - 20 (%hm.)
	α -hořké kyseliny 3,0 - 5,5 (%hm.)
	β -hořké kyseliny 4,5 - 8,0 (%hm.)
	poměr α/β 0,6 - 1,0
	kohumulon 24 - 26 (%rel.)
	kolupulon 39 - 42 (%rel.)
Chmelové silice	
	objem silic 0,4 - 1,0 (ml/100g chmele)
	β -myrcen 25 - 40 (%rel.)
	linalool 0,4 - 0,8 (%rel.)
	β -karyofylen 6 - 9 (%rel.)
	α -humulen 15 - 25 (%rel.)
	β -farnesen 14 - 20 (%rel.)
Chmelové polyfenoly	
	celkové polyfenoly 4,0 - 5,5 (%hm.)
	xanthohumul 0,30 - 0,50 (%hm.)
Poznámka: Žatecký poloraný červeňák je pěstován i v ozdravené (bezvirózní) formě.	